

ZONE 0016

○ LE ROCHER LECLERC

> DESCRIPTION

Ancien piton volcanique dominant une région de petits mornes boisés, entrecoupés de quelques savanes, sur une surface de 39 hectares.

Végétation correspondant globalement à un type intermédiaire entre la forêt sèche et la forêt moyennement humide (xéro-mésophile) et présentant à la base Est du Rocher Leclerc un îlot de forêt secondaire assez évoluée incluant quelques espèces de l'ancien climax comme l'Acomat franc (*Sideroxylon foetidissimum*).

Bon refuge boisé pour la faune aviaire des alentours.



Sommet du Rocher Leclerc

> INTÉRÊTS

- **Pédagogique** : découverte de cette formation volcanique par le biais d'une randonnée, le long d'une trace existante et conduisant à la base du Rocher.
- **Paysager** : beau paysage dû à la proéminence rocheuse émergeant des vallons boisés bords par la mer.
- **Géologique** : piton rocheux (andésite) spectaculaire et bien conservé.
- **Biologique** : présence d'espèces intéressantes et peu communes dans l'île : l'Acomat (*Sideroxylon foetidissimum*) ; une anthurium endémique de l'île (*Anthurium martinicense*).



Laurier Zabelle *Ocotea cernua*

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

- Baliser la trace qui conduit à la base du Rocher, afin d'éviter les débordements et les escapades hors sentier.
- Classer définitivement ce Rocher et ses alentours, afin d'assurer la pérennité du paysage et du milieu, dans le but d'éviter une destruction analogue à celle du Piton de Croix Rivail, au-dessus de la plaine du Lamentin.
- Protection immédiate : mise en place d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.
- Pour soutenir la dynamique et augmenter la biodiversité, il faudrait renforcer les populations d'Acomat Franc (*Sideroxylon foetidissimum*) actuellement limitées à un nombre trop restreint de semenciers adultes ; de même pour les Courbarils (*Hymenaea courbaril*). On pourrait également envisager la réinstallation du Gaïac (*Guaiacum officinale*), et du Palmier à Balais (*Coccothrinax barbadensis*), éléments importants et représentatifs du sous étage de la forêt sèche primitive de la Martinique.

