

Le Pluvier argenté est inscrit dans la liste des espèces "à préoccupation modérée" au Canada. La population américaine est jugée en léger déclin en 2019.

Statut de conservation mondial (2019) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : VU  
"Vulnerable / Vulnérable"

Menaces : perte de ses habitats, chasse durant sa migration, sensible aux dérangements humains sur ses sites d'hivernage (plages).



TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU PLUVIER ARGENTÉ



**CHASSABLE**  
**SOUS CONDITIONS**

Les conditions de chasse sont définies chaque année, retrouvez les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>


**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Pluvier argenté Pluvier grosse tête / Tinwin *Pluvialis squatarola*



Classes de taille





## Pluvier argenté



29 cm



74 cm



240 g

Limicole massif de taille moyenne. Le plus grand des pluviers.

Pattes gris foncé ; bec noir court droit et épais.

En vol, patch noir sous les ailes et base de la queue blanche.


Plumage nuptial : contrasté, dos sombre parsemé de taches blanches ; poitrine et face noires ; bas du ventre blanc ; calotte grise ; bande blanche sur la nuque se prolongeant de chaque côté du cou.

Plumage juvénile et hivernal : plus terne ; dos gris foncé tacheté de blanc ; ventre gris clair moucheté de brun ; sourcil blanc peu marqué.



Le Pluvier argenté se reproduit, sur les côtes et à proximité, dans l'ensemble de l'Arctique.

Espèce cosmopolite, il hiverne sur les côtes des Amériques (du Nord, centrale et du Sud), de l'ouest de l'Europe, d'Afrique, du sud de l'Asie, d'Indonésie et d'Australie.



Ils quittent les aires de reproduction entre juillet et septembre. Les juvéniles partent 5-6 semaines après les adultes.

La migration pré-nuptiale commence en avril. Les juvéniles et les autres non-reproducteurs restent dans les quartiers d'hiver ou migrent partiellement vers le nord au cours de leur premier été.

Les oiseaux du continent américain nichent dans le haut Arctique canadien, dans la toundra où le sol est caillouteux et la végétation est rase.

En hivernage, il fréquente davantage les vasières et les plages ; mais également les marais salins et les prairies pour se nourrir et se regrouper en reposoir.



Il est commun sur l'île, il y est un hivernant régulier. Il peut être observé toute l'année, mais il est le plus abondant d'août à mars.

Il se rencontre sur les vasières, les lagunes et les plages.

Pour plus d'informations  
sur les limicoles de Martinique





Sa chasse est interdite au Canada et aux USA depuis 1918. Il est classé "oiseaux à conservation préoccupante" aux USA depuis 2016, suite au déclin prononcé des effectifs.

Statut de conservation mondial (2016) : LC "Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : VU "Vulnerable / Vulnérable"

Menaces : perte de ses habitats, chasse durant sa migration, exposition aux pesticides dans les milieux agricoles et changements climatiques.

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU PLUVIER BRONZÉ



**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS


Les conditions de chasse sont définies chaque année, retrouvez les dispositions de l'année en cours ici



Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage. L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>


**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Pluvier bronzé Pluvier doré *Pluvialis dominica*



Classes de taille





## Pluvier bronzé



26 cm



70 cm



120 g


Limicole élancé de taille moyenne.

Longues pattes noires ; bec noir court et droit.

En vol, dessous des ailes clair et base de la queue sombre.

Plumage nuptial : contrasté ; dos sombre parsemé de taches blanches et de couleur bronze ; entre et face noir ; sourcil blanc se prolongeant sur le cou.

Plumage juvénile et hivernal : plus terne ; dos gris foncé tacheté de blanc, ventre gris clair moucheté de brun ; sourcil blanc.



Ce pluvier peut parcourir jusqu'à 30 000 km par an, une des espèces d'oiseaux réalisant les plus grandes migrations. Il est capable de parcourir 5 000 km au-dessus d'un océan sans se poser.

Durant sa migration postnuptiale (vers le sud), une partie de la population survole l'Atlantique Ouest. En revanche, lors de sa migration pré-nuptiale (vers le nord), les individus transitent surtout par le continent !

Le Pluvier bronzé niche dans la toundra arctique et subarctique.

Pendant la migration et en hivernage, il fréquente une multitude de milieux : prairies naturelles, champs de jeunes pousses, champs moissonnés ou brûlés, labours, pâturages, terrains de golf, pelouses d'aéroports, vasières, rivages côtiers et fluviaux.



Il est commun durant sa migration postnuptiale (septembre-novembre), dans les prairies rases, les labours, les vasières et les plages.

Il y est très rare en hivernage et durant la migration pré-nuptiale.

Pour plus d'informations  
sur les limicoles de Martinique





La maubèche est inscrite au Canada dans la liste des espèces "à préoccupation modérée". La population américaine est stable en 2019.

Statut de conservation mondial (2016) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : NA  
"Non Evaluated / Non applicable"

Menaces : perte de ses habitats, chasse, pesticides et bétail (piétinement des nichées).

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DE LA MAUBÈCHE DES CHAMPS



**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS

Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42




\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Maubèche des champs Poule vergenne

*Bartramia longicauda*





## Maubèche des champs



30 cm



66 cm



170 g


Limicole élancé de taille moyenne.

Pattes jaunes ; bec jaune court et droit ; grands yeux.

En vol, queue longue et fine ; extrémité des ailes (primaires) noirâtres.

Plumage adulte : peu contrasté ; dos brun parcouru de taches noires et rousses ; poitrine claire tachetée de chamois ; ventre blanc.

Plumage juvénile : plus clair.



Limicole migrateur au long cours, elle migre à travers les Grandes Plaines, l'Amérique centrale, le Golfe du Mexique et la plupart de l'Amérique du Sud.

Elles quittent les zones de reproduction fin août, début septembre et arrivent sur les zones d'hivernage fin septembre et en octobre. Le retour débute mi-février, les oiseaux arrivent alors sur les zones de reproduction de début avril à juin.

La Maubèche fréquente les vastes prairies de plaines en zones naturelles ou agricoles. C'est son habitat de prédilection, en reproduction comme en hivernage.

En hivernage, elle est présente dans les pampas d'Amérique du Sud.

Elle est rare et s'observe de fin août à début novembre. Elle est complètement absente en hivernage et à la remontée.

Elle fréquente les savanes, les pâturages, les champs labourés et les champs de canne où la végétation peut être rase ou haute si elle est clairsemée par secteurs. Elle est présente dans les terres.

Pour plus d'informations  
sur les limicoles de Martinique





Le Courlis corlieu américain est inscrit dans la liste des espèces "à préoccupation majeure" au Canada. La population américaine est jugée en déclin prononcé en 2019. Cette dernière est 20 fois moins importante que celle d'Europe.

Statut de conservation mondial (2016) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : VU  
"Vulnerable / Vulnérable"

Menaces : perte de ses habitats, chasse durant sa migration, dérangements humains et changements climatiques.

TENDANCE DE LA POPULATION AMÉRICAINE  
DU COURLIS CORLIEU



**CHASSABLE**  
**SOUS CONDITIONS**


Les conditions de chasse sont définies chaque année, retrouvez les dispositions de l'année en cours ici



Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage. L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Courlis corlieu américain Bec crochu

*Numenius phaeopus hudsonicus*

UICN\*

- RE
- CR
- EN
- VU ✓
- NT
- LC
- DD NA





## Courlis corlieu américain



44 cm



81 cm



390 g


Limicole élancé de grande taille ; un des plus gros limicoles rencontrés en Martinique.

Grandes pattes grise bleu et long bec foncé arqué vers le bas.

Longues ailes tachetées de points blancs. Tête avec des rayures claires.

Plumage adulte : dessus brun sombre parcouru de lisérés blancs ; poitrine brun clair tachetée et ventre brun clair.

Plumage juvénile : proche de l'adulte ; marques blanches plus grandes sur le dessus.



- Hivernage
- Reproduction
- Migration

La population nicheuse de l'est américain migre par la côte Atlantique de l'Amérique du Nord à l'automne, puis survole la Caraïbe pour se rendre sur ses quartiers d'hivernage. La plupart des individus vont directement en Amérique du Sud. Cependant certains individus font halte sur des îles des Petites Antilles, le plus souvent lors d'intempéries.

Ils effectuent ainsi tous les ans un périple de quelques 20 000 km !

Les oiseaux du continent américain nichent dans le haut Arctique canadien, dans la toundra où le sol est caillouteux et la végétation est rase.

En hivernage, ils fréquentent davantage les vasières et les plages ; également les marais salins et les prairies pour se nourrir et se regrouper en reposoir.

Ce courlis corlieu est peu commun mais régulier tous les ans. Il est côtier (plages et lagunes, vasières de mangrove), il peut cependant fréquenter les terres (labours inondés et marais de chasse).

Il est surtout présent en migration postnuptiale (juillet-novembre), ainsi qu'en migration pré-nuptiale (avril-mai). Il est plus rare en hivernage.

Pour plus d'informations  
sur les limicoles de Martinique





La Barge hudsonienne est inscrite dans la liste des espèces "à préoccupation majeure" au Canada. La population est jugée en déclin en 2019.

Statut de conservation mondial (2016) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : NA  
"Non Evaluated / Non applicable"

Menaces : perte de ses habitats, chasse durant sa migration, pollution, dérangements humains et changements climatiques.



TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DE LA BARGE HUDSONIENNE

**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS

Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42




\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Barge hudsonienne

Barge  
*Limosa haemastica*



Classes de taille



## Description

### Barge hudsonienne



42 cm



74 cm



300 g

Limicole élancé de grande taille ; un des plus gros limicoles rencontrés en Martinique.


Longues pattes noires ; long bec noir légèrement retroussé et rose à la base.

Ligne blanche sur fond noir sur le dessus des ailes visible en vol ; queue noire à base blanche.

Plumage internuptiale :  
dessus brun sombre ;  
dessous brun clair ;  
large sourcil blanc.



## Répartition



Lors de la migration postnuptiale, les individus transitent par la côte nord-est américaine puis par l'Atlantique pour rejoindre leurs aires d'hivernage en Amérique du Sud.

Puis en direction des sites de reproduction, les Barges hudsoniennes migrent rapidement, elles utilisent peu ou pas de site de halte en Amérique du Sud, elles passent ensuite par le centre des États-Unis.

## Mouvements

## Habitat

Cette barge niche dans la toundra arctique.

Puis elle hiverne dans les marais de la pampa et sur les vasières littorales.

## Martinique

Elle est rare sur l'île. Elle n'y fait que des haltes, elle est observée de septembre à octobre.

Elle fréquente les marais de chasse aménagés, ainsi que les lagunes, les vasières de mangrove, et les champs inondés.

Pour plus d'informations  
sur les limicoles de Martinique







TENDANCE DE LA POPULATION AMÉRICAINE  
DE TOURNEPIERRE À COLLIER

**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS

Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici



La population américaine (ssp *morinella*) a été récemment classée "à préoccupation majeure" aux États-Unis et au Canada. La population de cette sous-espèce est jugée en déclin prononcé en 2019.

Statut de conservation mondial (2019) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"


Menaces : perte de ses habitats, changements climatiques et chasse durant sa migration.

Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Tournepierre à collier Pluvier des salines *Arenaria interpres*



Classes de taille





Description

Tournepieuvre à collier

 24 cm

 53 cm

 110 g

Limicole trapu de taille moyenne.

Courtes pattes orange ; bec noir court et droit.

Deux longues bandes blanches sur le dessus des ailes visibles en vol.

Plumage nuptial : tête blanche et noire ; haut de la poitrine noir ; ventre blanc ; dos et ailes roux et noirs.

Plumage juvénile et hivernal : plus terne ; dos et tête brun sombre avec quelques motifs de couleur rousse.


Ventre blanc et motif pectoral sombre.



Répartition

Le Tournepieuvre à collier est une espèce cosmopolite composée deux sous-espèces : *interpres* (Ancien Monde) et *morinella* (Nouveau Monde).

Seule cette dernière fréquente les Petites Antilles, elle niche dans le nord-est de l'Alaska et le haut arctique canadien ; elle hiverne sur les côtes de la Caroline du Sud jusqu'au milieu du Chili et jusqu'au nord de l'Argentine.



Mouvements

Après la reproduction, il migre vers l'Amérique du Sud par les côtes pacifiques et atlantiques. Les juvéniles partent vers le sud un mois plus tard que les adultes, à partir de mi-août à début septembre.

Ils volent par groupes d'une dizaine d'oiseaux. Ils hivernent en très grands nombres dans le nord de l'Amérique du Sud. Le Tournepieuvre à collier est très fidèle à ses sites d'hivernage.

Habitat

Sur les sites de nidification, ils fréquentent les plaines côtières rocheuses, pentes marécageuses et toundra ; toujours près des endroits qui restent humides tardivement en été.

Sur ses aires d'hivernage, il est principalement côtier ; rochers, plages de sable avec algues échouées, plage de galets, jetées rocailleuses. Il apparaît à l'intérieur des terres seulement pendant la migration.



Le Tournepieuvre à collier est essentiellement côtier. Il fréquente les plages et les côtes rocheuses.

Il est commun en hivernage, avec des effectifs plus importants à la période des migrations postnuptiale (août-octobre) et prénuptiale (avril-mai). Ils peuvent cependant s'observer toute l'année sur l'île, notamment du fait que des juvéniles ne partent pas nicher la première saison.

Martinique

Pour plus d'informations sur les limicoles de Martinique





La population américaine (ssp *rufa*) est classée "espèce menacée" aux États-Unis et "espèce en danger" au Canada du fait d'un déclin prononcé de ses effectifs.

Statut de conservation mondial (2018) : NT  
"Near Threatened / Quasi menacé"

Statut de conservation en Martinique (2020) : VU  
"Vulnerable / Vulnérable"

Menaces : surexploitation de ses ressources alimentaires, perte de ses habitats, changements climatiques et action humaine (pollution, chasse, dérangement).

TENDANCE DE LA POPULATION AMÉRICAINE  
DU BÉCASSEAU MAUBÈCHE




**PROTÉGÉ**  
la chasse du Bécasseau maubèche  
est interdite en Martinique,  
cette espèce est protégée depuis 2013

Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage. L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine ([lemoine\\_v@yahoo.fr](mailto:lemoine_v@yahoo.fr))  
Textes & photographies : Anthony Levesque ([anthony.levesque@wanadoo.fr](mailto:anthony.levesque@wanadoo.fr))  
Illustrations : Maël Dewynter ([mael.dewynter@gmail.com](mailto:mael.dewynter@gmail.com))

# Limicoles de Martinique

## Bécasseau maubèche

*Calidris canutus*

UICN\*

- RE
- CR
- EN
- VU ✓
- NT
- LC
- DD
- NA





## Bécasseau maubèche



27 cm



58 cm



135 g


Limicole trapu de taille moyenne ; le plus gros bécasseau rencontré aux Antilles.

Courtes pattes jaune verdâtre ; bec noir court et droit.

Longues ailes avec une étroite bande blanche sur le dessus visible en vol ; queue blanche avec stries grises.

Plumage internuptial : poitrine brun roux ; dos gris sombre avec des taches noires.

Plumage juvénile et hivernal : terne ; dos gris clair et ventre blanc.



Les individus de la sous-espèce *rufa* quittent le nord-est de l'Amérique du Nord vers les côtes guyanaises avec relativement peu de sites d'arrêt.

La majorité des individus continue ensuite jusqu'à la Patagonie et la Terre de Feu. À l'occasion d'intempéries, ils se posent alors sur les îles des Petites Antilles notamment.

Ils effectuent ainsi tous les ans un périple de quelques 32 000 km !

En période de reproduction, il est présent dans la toundra de l'arctique canadien.

En périodes de migration et d'hivernage, il est strictement côtier et fréquente alors les plages, les bancs rocaillieux, les baies et les lagunes.

Le Bécasseau maubèche est essentiellement côtier en Martinique. Il fréquente les plages, les vasières et lagunes littorales.

Il y est rare, il est observé irrégulièrement durant sa migration postnuptiale (septembre-novembre).

Pour plus d'informations  
sur les limicoles de Martinique





Le Bécasseau à échasses est inscrit dans la liste des espèces "à préoccupation majeure" au Canada. La population est jugée en déclin en 2019.

Statut de conservation mondial (2016) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : VU  
"Vulnerable / Vulnérable"

Menaces : perte de ses habitats, chasse et changements climatiques.

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU BÉCASSEAU À ÉCHASSES



Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels  
pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

DEAL Martinique, 2023

Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Bécasseau à échasses Chevalier pieds verts *Calidris himantopus*

UICN\*

RE

CR

EN

VU ✓

NT

LC

DD

NA



Classes de taille





Description

Bécasseau à échasses



Limicole élancé de taille moyenne.


Longues pattes jaune verdâtre, long bec noir légèrement courbé vers le bas.

En vol, dessus des ailes uni et base de la queue blanche.

Plumage internuptial : dos gris foncé à lisérés blancs fins, dessous blanc avec quelques stries et sourcil blanc bien marqué.

Plumage nuptial : taches noires sur le dessous et le dessus, joues rousses.


Plumage juvénile : taches rousses sur le dessous et le dessus, et calotte brune.



Répartition

Le Bécasseau à échasses est une espèce américaine.

Son aire de reproduction est réduite, il niche dans quelques secteurs côtiers de l'Arctique américain et canadien. Quant à son aire d'hivernage, elle est vaste et couvre une grande partie de l'Amérique du Sud, ainsi que la Caraïbe et une partie de l'Amérique centrale.



Il rejoint ses quartiers d'hivernage en utilisant un large couloir migratoire localisé sur la moitié est de l'Amérique du Nord.


Il hiverne dans une vaste partie nord de l'Amérique du Sud, avec comme limite le nord du Chili, le nord de l'Argentine et l'est du Brésil. Certains individus stationnent sur les côtes du sud des USA et du Mexique et dans la Caraïbe.

Mouvements

Habitat

Il niche principalement dans la toundra sèche du subarctique.

En hivernage, il recherche particulièrement les zones humides d'eau douce et saumâtre peu profondes, champs inondés, bassins de décantation. Il fréquente plus rarement les plages.



Le Bécasseau à échasses est commun. Il est observé toute l'année, cependant il est plus abondant lors de la migration postnuptiale en août-septembre.

Il fréquente les lagunes, les vasières de mangrove, les zones inondées d'eau douce. Il apprécie les marais de chasse aménagés.

Martinique

Pour plus d'informations sur les limicoles de Martinique





Ce bécasseau est inscrit dans la liste des espèces "à préoccupation modérée" au Canada. La population est jugée en déclin prononcé en 2019.

Statut de conservation mondial (2016) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Menaces : perte de ses habitats, chasse et changements climatiques.

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU BÉCASSEAU À POITRINE CENDRÉE



**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS

Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Bécasseau à poitrine cendrée

### Dos rouge

*Calidris melanotos*





## Bécasseau à poitrine cendrée



22 cm



46 cm



73 g

Limicole élancé de taille moyenne.


Longues pattes jaune verdâtre ; court bec jaune à pointe sombre.

En vol, dessus des ailes uni ; queue avec bande noire médiane bordée de blanc de chaque côté.

Plumage internuptial : dos brun à liséré roux et blanc ; poitrine fortement tachetée, ventre blanc.


Plumage nuptial : dessus encore plus marqué de roux ; poitrine encore plus tachetée.

Plumage juvénile : dessus encore plus marqué de roux ; poitrine chamois à taches noires.



Il n'y a pas de sous-espèce, néanmoins il se distingue deux populations. Une population "américaine" dont l'aire de reproduction s'étend de l'Alaska jusqu'à l'ouest de la Baie d'Hudson (Canada) ; une autre "sibérienne" située dans le nord-est de la Russie depuis la péninsule du Taïmyr.

La population américaine et une partie de celle de Sibérie hivernent en Amérique du Sud.



Il rejoint ses quartiers d'hivernage en Amérique du Sud en transitant par un large couloir migratoire localisé sur la moitié est de l'Amérique du Nord, et ensuite par l'Amérique centrale et la Caraïbe.

Il hiverne dans une vaste partie nord de l'Amérique du Sud, avec comme limite le nord du Chili, le nord de l'Argentine et l'est du Brésil.

Il niche dans la toundra du haut arctique nord américain, où la végétation de mousses et de lichens est basse.

En migration et en hivernage, ce bécasseau utilise une variété d'habitats d'eau douce et saumâtre, le long du littoral ou à l'intérieur des terres.



Il est **commun**, il est présent uniquement lors de la migration postnuptiale, soit d'août à novembre.

Il fréquente toutes les zones humides avec une préférence pour l'eau douce, prairies inondées, champs labourés, champs de canne, du moment que la végétation y soit rase.

Pour plus d'informations  
sur les limicoles de Martinique





Le Bécasseau semipalmé est inscrit dans la liste des espèces "à préoccupation majeure" au Canada. La population est jugée en déclin en 2019.

Statut de conservation mondial (2016) : NT  
"Near Threatened / Quasi menacé"

Statut de conservation en Martinique (2020) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Menaces : perte de ses habitats, changements climatiques, chasse en Amérique du Sud et dérangement humain sur site d'hivernage.

TENDANCE DE LA POPULATION AMÉRICAINE  
DU BÉCASSEAU SEMIPALMÉ




**PROTÉGÉ**  
la chasse du Bécasseau semipalmé  
est interdite en Martinique,  
cette espèce est protégée depuis 1989

Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Bécasseau semipalmé Maringouin / Alouette *Calidris pusilla*

UICN\*

- RE
- CR
- EN
- VU
- NT
- LC ✓
- DD
- NA



Classes de taille





## Bécasseau semipalmé



14 cm



36 cm



22 g


Limicole élancé de petite taille ; un des plus petits limicoles rencontrés aux Antilles.

Courtes pattes noir ; bec noir court et droit.

En vol, étroite bande blanche sur le dessus ; queue avec bande noire médiane bordée de blanc de chaque côté.

Plumage hivernal : dos uni brun-gris ; ventre blanc ; flancs non tachetés ; sourcil blanc peu marqué.

Plumage juvénile : dos brun à liséré blanc et roux ; poitrine légèrement rousse ; sourcil plus net.



Il est capable de vols de 4 000 km non-stop. Durant les migrations, il se regroupe par dizaines de milliers sur des sites de halte très connus, la baie de Fundy (Canada) durant la migration postnuptiale, et la baie de Delaware (États-Unis) au moment de la migration pré-nuptiale.

Environ les deux-tiers des juvéniles restent leur première année sur les zones d'hivernage.

Il se reproduit dans la toundra humide, sur les côtes ou dans les terres près des plans d'eau et des rivières.

En migration, il apparaît sur une variété de marais côtiers ou intérieurs. En hivernage, plus abondant sur les plages, les vasières littorales et les lagunes.



Le Bécasseau semipalmé est très commun, il est visible en grand nombre entre août et octobre. Il peut s'observer quasiment toute l'année.

Il est essentiellement côtier, il fréquente les plages, les lagunes mais aussi les marais de chasse.

Pour plus d'informations  
sur les limicoles de Martinique





Le Bécassin roux est inscrit dans la liste des espèces "à préoccupation majeure" au Canada. La population est jugée en déclin prononcé en 2019.

Statut de conservation mondial (2016) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : NT  
"Near Threatened / Quasi menacé"

Menaces : perte de ses habitats, chasse et changements climatiques.

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU BÉCASSIN ROUX



**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS

Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.

Pourcentage d'augmentation ou de diminution  
depuis 1970 des oiseaux du Canada



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels  
pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

DEAL Martinique, 2023

Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Bécassin roux Grise long bec

*Limnodromus griseus*

UICN\*

RE

CR

EN

VU

NT ✓

LC

DD

NA



Classes de taille





Description

Bécassin roux



Limicole trapu de taille moyenne.

Pattes jaune gris, très long bec droit et épais de couleur plus sombre vers la pointe.

Triangle blanc bien visible en vol dans le bas du dos ; extrémités des ailes noires sur la partie supérieure.

Plumage internuptial : dessus gris ; dessous blanc et sourcil blanc bien marqué.


Plumage nuptial et juvénile : poitrine rousse ; dos à taches noires à liseré blanc et roux ; poitrine mouchetée et flancs striés (adulte).



Répartition

Il s'agit d'une espèce américaine, avec une aire de reproduction restreinte et bien délimitée suivant trois sous-espèces.

La sous-espèce *griseus* qui concerne les Petites Antilles, se reproduit au nord du Québec et à l'ouest du Labrador et hiverne sur les côtes est et sud des États-Unis jusqu'au Brésil.



Mouvements

Migrateur au long cours, chaque sous-espèce utilise sa propre voie sur un large front, allant hiverner jusqu'aux côtes nord de l'Amérique du Sud.


Les femelles quittent les aires de reproduction dès le début de juillet, avant les mâles, les juvéniles à partir de la fin juillet.

Des juvéniles restent l'été sur leur aire d'hivernage.

Habitat

En reproduction, il est présent principalement dans la taïga, et également dans la toundra côtière marécageuse.

En hivernage, il fréquente davantage les milieux salés, dont les vasières littorales, les bordures de mangrove, les lagunes et les plages sableuses. Il se rencontre également à l'intérieur des terres en migration.



Martinique

Il est commun sur l'île. Il s'observe pratiquement toute l'année mais principalement lors de la migration postnuptiale, de juillet à octobre. Il hiverne parfois et il est plus rare de février à juin.

Il se rencontre sur les vasières de mangrove, les lagunes et les plages.

Pour plus d'informations sur les limicoles de Martinique





La Bécassine de Wilson est inscrite dans la liste des espèces "à préoccupation mineure" au Canada. La population est jugée stable en 2019.

Statut de conservation mondial (2020) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : NT  
"Near Threatened / Quasi menacé"

Menaces : perte de ses habitats et changements climatiques.

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DE LA BÉCASSINE DE WILSON →



**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS

Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Bécassine de Wilson Bécassine

*Gallinago delicata*

UICN\*

- RE
- CR
- EN
- VU
- NT ✓
- LC
- DD NA





Bécassine de Wilson



27 cm



46 cm



105 g

Limicole trapu de taille moyenne. Pattes jaune gris ; très long bec droit et épais de couleur plus sombre vers la pointe.


Vol rapide en zigzag ; quatre raies claires sur le dos.

Plumage : très peu de différences entre les plumages (nuptial, internuptial, juvénile) ; brun roux tête rayée ; poitrine tachetée ; flancs barrés ; ventre blanc.



Il s'agit d'une espèce américaine, à large aire de reproduction qui s'étend sur presque l'ensemble du Canada, et le nord des États-Unis y compris l'Alaska.

Elle hiverne sur une grande partie sud des États-Unis, l'Amérique centrale, la Caraïbe et l'extrême nord de l'Amérique du Sud (Colombie, Vénézuéla, Guyane, Suriname).



La Bécassine de Wilson est migratrice, cependant pas au long cours.

D'ailleurs, dans le nord ouest des États-Unis et sud-ouest du Canada, des individus sont présents à l'année.

En reproduction, elle occupe aussi bien la toundra, la taïga, que des secteurs de milieux naturels tempérés.

En hivernage, la Bécassine de Wilson recherche les zones humides avec un couvert végétal afin de se dissimuler, c'est une espèce particulièrement discrète.



Elle est commune en migration postnuptiale et en hivernage, soit de septembre à mars.

Elle occupe alors les mares pour le bétail, les zones inondées (savanes et les champs à végétation rase) et les bordures de mangrove. Certains individus peuvent rester jusqu'à mi-avril si la mangrove n'est pas complètement asséchée.

Pour plus d'informations sur les limicoles de Martinique





Le Chevalier solitaire est inscrit dans la liste des espèces "à préoccupation modérée" au Canada. La population est jugée stable en 2019.

Statut de conservation mondial (2018) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Menaces : perte de ses habitats, changements climatiques et pollution.

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU CHEVALIER SOLITAIRE →




**PROTÉGÉ**  
la chasse du Chevalier solitaire  
est interdite en Martinique,  
cette espèce est protégée depuis 1989

Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine ([lemoine\\_v@yahoo.fr](mailto:lemoine_v@yahoo.fr))  
Textes & photographies : Anthony Levesque ([anthony.levesque@wanadoo.fr](mailto:anthony.levesque@wanadoo.fr))  
Illustrations : Maël Dewynter ([mael.dewynter@gmail.com](mailto:mael.dewynter@gmail.com))

# Limicoles de Martinique

## Chevalier solitaire Pissa *Tringa solitaria*

UICN\*

- RE
- CR
- EN
- VU
- NT
- LC ✓
- DD
- NA



Classes de taille



Description

Chevalier solitaire



22 cm



56 cm



50 g

Limicole élancé de taille moyenne.

Courtes pattes vertes olive ; bec long droit et fin.

En vol, queue avec bande noire médiane bordée de blanc rayé de noir de chaque côté.

Plumage : dos brun finement tacheté de blanc ; cou rayé de brun noirâtre ; ventre blanc ; cercle oculaire blanc très marqué.


Hoche souvent la queue.



Répartition

Le Chevalier solitaire est une espèce américaine, il y a deux sous-espèces. Son aire de reproduction est vaste, il niche en forêt boréale (taïga) d'Alaska et du Canada.

Il hiverne en Amérique centrale, dans la Caraïbe et en Amérique du Sud (à l'exception du Chili d'une grande partie sud de l'Argentine et du Pérou).



Il migre rarement en groupe et transite par l'intérieur sur un large front (centre et est des États-Unis).

Après la reproduction, une partie des individus passent apparemment au-dessus de l'ouest de l'Atlantique, directement des provinces canadiennes maritimes, vers le Nord de l'Amérique du Sud. Les deux sous-espèces se mélangent sur les aires d'hivernage.

Mouvements

Habitat

En reproduction, il niche en forêt humide boréale, habituellement en terrain plutôt découvert avec des arbres dispersés.

En migration et en hivernage, il est plus abondant en milieu d'eau douce dans les terres, au niveau des prairies humides, des fossés et mares temporaires faites d'eau stagnante.



Le Chevalier solitaire est commun, il est le plus souvent solitaire. Il hiverne mais il est visible en plus grand nombre en migration (septembre et octobre).

Dans les terres et près de la côte, il fréquente surtout les marais de mangrove, les mares à bétail, les bords de canaux urbains.

Martinique

Pour plus d'informations sur les limicoles de Martinique





Le Grand Chevalier est inscrit dans la liste des espèces "préoccupation majeure" au Canada. La population est jugée stable en 2019.

Statut de conservation mondial (2016) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Menaces : perte de ses habitats, exposition aux pesticides, changements climatiques et chasse importante durant ses migrations et en hivernage.

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU GRAND CHEVALIER



Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42




\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

DEAL Martinique, 2023  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Grand Chevalier Clin *Tringa melanoleuca*



Classes de taille



Description

Grand Chevalier



Limicole élancé de taille moyenne.

Longues pattes jaunes ou orange ; long bec fin à base claire légèrement courbé vers le haut.

En vol, base de la queue blanche ; extrémités des ailes noires sur la partie supérieure.

Très semblable au Petit Chevalier, seules la taille de l'individu et la longueur du bec les différencient.

Plumage : dessus brun foncé tacheté de blanc ; tête, cou et poitrine gris finement rayés de blanc ; dessous blanc.




1<sup>er</sup> plan : Grand Chevalier / 2<sup>ème</sup> plan : Petit Chevalier

Répartition

Le Grand Chevalier est une espèce américaine pour laquelle il n'y a pas de sous-espèce. Son aire de reproduction est très large, elle s'étend sur toute partie centrale du Canada et du sud de l'Alaska.

Il hiverne du sud des États-Unis jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, y compris en Amérique centrale et dans la Caraïbe.



■ Hivernage  
■ Reproduction  
■ Migration

Mouvements

Il migre sur un large front couvrant l'ensemble des États-Unis. Durant sa migration postnuptiale en direction de l'Amérique du Sud, les oiseaux de la côte est transitent le long de la côte atlantique et passent ensuite par la Caraïbe. Le plateau des Guyanes semble accueillir les plus gros effectifs.

De nombreux oiseaux non-reproducteurs, restent sur les sites d'hivernage toute l'année.

Habitat

En période de reproduction, il niche dans la taïga.

En migration et en hivernage, il est présent dans une grande variété de milieux côtiers ou intérieurs, souvent avec de la végétation en développement. Il fréquente les marais, les lagunes, les vasières, les salines, et également les terres arables et les prairies inondées.



Le Grand Chevalier est commun. Présent presque toute l'année, il est tout de même plus abondant d'août à novembre lors de la migration postnuptiale.

Il est observable dans les marais côtiers, les lagunes, les vasières de mangrove, dans les canaux urbains et dans les champs inondés.

Martinique

Pour plus d'informations sur les limicoles de Martinique





Le Chevalier semipalmé est inscrit dans la liste des espèces "à préoccupation majeure" au Canada. La population est jugée en déclin en 2019.

Statut de conservation mondial (2016) : LC  
"Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : NT  
"Near Threatened / Quasi menacé"

Menaces : perte de ses habitats, chasse durant sa migration, sensible aux dérangements humains sur ses sites d'hivernage (plages).

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU CHEVALIER SEMIPALMÉ



**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS

Les conditions de chasse  
sont définies chaque année, retrouvez  
les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42




\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>

**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Chevalier semipalmé Ailes blanches

*Tringa semipalmata*



Classes de taille



## Chevalier semipalmé



38 cm



66 cm



215 g

Limicole massif de grande taille. Le plus grand des chevaliers.

Pattes grises ; long bec droit et épais de couleur grise à pointe plus sombre.


En vol, un large bande blanche est visible sur le dessous des ailes et base de la queue blanche.

Plumage internuptial : terne ; dessous gris pâle et dessous blanc.



Il s'agit d'une espèce américaine, subdivisée en deux sous-espèces qui ont des aires de reproduction bien distinctes *inornatus* à l'ouest de l'Amérique du Nord et *semipalmata* à l'est, cette dernière est dominante aux Petites Antilles.

La sous-espèce *semipalmata* est présente du sud du Nouveau-Brunswick (Canada) jusqu'aux côtes du golfe du Mexique, ainsi que dans la Caraïbe et le nord de l'Amérique du Sud.



Moins migratrice que celle de l'ouest, la sous-espèce de l'est hiverne surtout autour du golfe du Mexique et dans la Caraïbe. Elle est plus commune dans les Grandes Antilles que dans les Petites Antilles.

En hivernage, elle peut cependant migrer jusqu'au nord du Brésil.

Les oiseaux de la sous-espèce *semipalmata* sont surtout côtiers et nichent dans les marais salants.

En hivernage, ils fréquentent divers milieux littoraux : marais salants, lagunes, vasières, plages de sable et côtes rocheuses.

Il est peu commun sur l'île et très localisé, il est cependant présent tous les ans.

Il fréquente alors les zones humides plutôt littorales, notamment les lagunes, les bords de mangrove, les plages, plus rarement les marais de chasse.

Il est observable lors la migration prénuptiale (avril-mai) et lors de la migration postnuptiale (juillet-octobre), il est rare en hivernage.

Pour plus d'informations sur les limicoles de Martinique





Le Petit Chevalier est inscrit dans la liste des espèces "hautement en péril" au Canada. La population est jugée en déclin prononcé en 2019 de l'ordre de 75 à 95 % des effectifs.

Statut de conservation mondial (2016) : LC "Least Concern / Préoccupation mineure"

Statut de conservation en Martinique (2020) : LC "Least Concern / Préoccupation mineure"

Menaces : perte de ses habitats, exposition aux pesticides, changements climatiques et chasse importante durant ses migrations et en hivernage.

TENDANCE DE LA POPULATION MONDIALE  
DU PETIT CHEVALIER



**CHASSABLE**  
SOUS CONDITIONS

Les conditions de chasse sont définies chaque année, retrouvez les dispositions de l'année en cours ici




Les limicoles font partie du groupe d'espèces d'oiseaux dont les effectifs ont le plus diminué ces 50 dernières années.

Au Canada, il a été évalué une baisse moyenne de 40 % des effectifs depuis 1970, avec une décroissance allant à 52 % pour les espèces migrant sur de grandes distances.

Les limicoles dépendent des régions côtières et des milieux humides intérieurs pour leur reproduction, leur migration et leur hivernage.

L'aménagement des côtes et d'autres perturbations d'origine humaine entraînent la perte de nombreuses zones vitales pour ces oiseaux.



Source: Initiative de conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord (Canada). 2019. L'état des populations d'oiseaux du Canada, 2019. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, 12 p. [www.etatdesoiseauxcanada.org](http://www.etatdesoiseauxcanada.org)

Les partenariats internationaux sont essentiels pour assurer la conservation des limicoles.

DEAL Martinique  
Pointe de Jaham - BP 7212  
97 234 SCHOELCHER cedex  
Tel : 0596.59.57.00  
[www.martinique.developpement-durable.gouv.fr](http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr)



OFB Martinique  
5 rue de la Dorade. Anse à l'Ane  
97 229 TROIS-ÎLETS  
Tel : 0596.70.41.42



\* <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/07/liste-rouge-faune-de-martinique.pdf>


**DEAL Martinique, 2023**  
Maquette : Vincent Lemoine (lemoine\_v@yahoo.fr)  
Textes & photographies : Anthony Levesque (anthony.levesque@wanadoo.fr)  
Illustrations : Maël Dewynter (mael.dewynter@gmail.com)

# Limicoles de Martinique

## Petit Chevalier Pattes jaunes *Tringa flavipes*



Classes de taille





Description

Petit Chevalier

 27 cm

 60 cm

 80 g


Limicole élancé de taille moyenne.

Longues pattes jaunes rarement orange ; bec long droit, très fin et pointu.

En vol, base de la queue blanche ; extrémités des ailes noires sur la partie supérieure.

Très semblable au Grand Chevalier, seules la taille de l'individu et la longueur du bec les différencient.


Plumage : dessus brun foncé finement tacheté de blanc ; tête, cou et poitrine gris rayés de blanc ; dessous blanc.



Répartition

Le Petit Chevalier est une espèce américaine pour laquelle il n'y a pas de sous-espèce. Son aire de reproduction est très large, elle s'étend depuis l'est de la Baie d'Hudson (Canada) jusqu'à l'Alaska.

Il hiverne du sud des États-Unis jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, y compris en Amérique centrale et dans la Caraïbe.



Mouvements

Il migre sur un large front couvrant l'ensemble du sud du Canada et sur tous les États-Unis. Certains volent directement jusqu'aux Petites Antilles et au nord de l'Amérique du Sud, d'autres descendent vers le sud le long des littoraux atlantique et pacifique.

Le gros de la population hiverne aux Antilles et au nord de l'Amérique du Sud ; il est le plus abondant sur le plateau des Guyanes.

Habitat

Il niche dans la taïga mais également plus au nord dans la toundra.

En migration et en hivernage, il est présent dans une grande variété de milieux côtiers ou intérieurs, souvent avec de la végétation en développement. Il fréquente les marais, les lagunes, les vasières, les salines, et également les terres arables et les prairies inondées.



Le Petit Chevalier est commun. Présent presque toute l'année, il est tout de même plus abondant d'août à novembre.

Il est observable dans les marais côtiers, les lagunes, les vasières de mangrove, dans les canaux urbains et dans les champs inondés.

Martinique

Pour plus d'informations sur les limicoles de Martinique.

