

III.2.4.2. Liste de référence d'« espèces végétales » caractéristiques de zones humides à la Martinique

Tableau 8 : Liste de référence d'« espèces végétales » caractéristiques de zone humide (TaxRef V17.0 - 2024) à la Martinique.

Absolu : caractéristique de la présence d'une zone humide. Nombre d'espèces végétales cotées « absolu » : 55.
Relatif : potentiellement caractéristique de la présence d'une zone humide. Nombre d'espèces végétales cotées « relatif » : 109.

1 881 espèces végétales seraient présentes¹⁶ à la Martinique d'après TaxRef V17.0.

CD NOM (TaxRef V17.0)	Nom de l'espèce (NOM_COMPLET TaxRef V17.0)	Présence d'une zone humide
447950	<i>Acrostichum aureum</i> L., 1753	absolu
731486	<i>Acrostichum danaeifolium</i> Langsd. & Fisch., 1810	absolu
81831	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879	absolu
629063	<i>Ammannia baccifera</i> L., 1753	absolu
82120	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb., 1773	absolu
629064	<i>Ammannia latifolia</i> L., 1753	absolu
629078	<i>Aniseia martinicensis</i> (Jacq.) Choisy, 1837	absolu
446898	<i>Annona glabra</i> L., 1753	absolu
629127	<i>Avicennia germinans</i> (L.) L., 1764	absolu
629128	<i>Avicennia schaueriana</i> Stapf & Leechm. ex Moldenke, 1939	absolu
446166	<i>Canna glauca</i> L., 1753	absolu
629257	<i>Caperonia palustris</i> (L.) A.St.-Hil., 1824	absolu
446178	<i>Cladium mariscus</i> subsp. <i>jamaicense</i> (Crantz) Kük., 1938	absolu
448075	<i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H.Itô, 1937	absolu
629512	<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb., 1773	absolu
93924	<i>Cyperus esculentus</i> L., 1753	absolu
859799	<i>Cyperus subsquarrosus</i> (Muhl.) Bauters, 2014	absolu
718678	<i>Diplachne fusca</i> var. <i>fascicularis</i> (Lam.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012	absolu
629595	<i>Echinochloa polystachya</i> (Kunth) Hitchc., 1920	absolu
732275	<i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc. & Chase, 1917	absolu
629596	<i>Echinodorus berteroi</i> (Spreng.) Fassett, 1955	absolu
629603	<i>Eleocharis elegans</i> (Kunth) Roem. & Schult., 1817	absolu
629605	<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult., 1817	absolu
629609	<i>Eleocharis mutata</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	absolu
629624	<i>Epaltes brasiliensis</i> DC., 1836	absolu

¹⁶ Nombre d'espèces considérées avec les cotations « présent (indigène ou indéterminé) », « natif », « endémique », « subendémique », « cryptogène », « introduit », « introduit envahissant » parmi les Angiospermes, les Gymnospermes et les Ptéridophytes, avec la validité « NR » (nom de référence) sur TaxRef V17, version en cours, consultée via TaxRef-Web et groupes opérationnels en date du 03/12/2024 (source : G. Gigot PatriNat).

CD NOM (TaxRef V17.0)	Nom de l'espèce (NOM_COMPLET TaxRef V17.0)	Présence d'une zone humide
629660	<i>Eriochloa punctata</i> (L.) Desv. ex Ham., 1825	absolu
629702	<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle, 1910	absolu
629740	<i>Fimbristylis ferruginea</i> (L.) Vahl, 1805	absolu
453935	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich., 1826	absolu
629741	<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl, 1806	absolu
629753	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb., 1773	absolu
629875	<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees, 1829	absolu
630001	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn., 1807	absolu
630019	<i>Leersia hexandra</i> Sw., 1788	absolu
888902	<i>Louisiella elephantipes</i> (Nees ex Trin.) Zuloaga, 2014	absolu
630062	<i>Ludwigia erecta</i> (L.) H.Hara, 1953	absolu
630063	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G.Don) Exell, 1957	absolu
716558	<i>Meniscium serratum</i> Cav., 1802	absolu
630182	<i>Montrichardia arborescens</i> (L.) Schott, 1854	absolu
109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	absolu
630221	<i>Neptunia plena</i> (L.) Benth., 1841	absolu
630339	<i>Pavonia paludicola</i> Nicolson ex Fryxell, 1989	absolu
769027	<i>Persicaria acuminata</i> (Kunth) M.Gómez, 1896	absolu
769031	<i>Persicaria punctata</i> (Elliott) Small, 1903	absolu
630517	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq., 1763	absolu
447470	<i>Rhizophora mangle</i> L., 1753	absolu
446204	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton, 1892	absolu
630550	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter, 1953	absolu
636281	<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne, 1877	absolu
630621	<i>Scleria eggersiana</i> Boeckeler, 1890	absolu
706806	<i>Setaria geminata</i> (Forssk.) Veldkamp, 1994	absolu
735178	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn., 1788	absolu
630937	<i>Stigmaphyllon bannisterioides</i> (L.) C.E.Anderson, 1992	absolu
673076	<i>Urochloa mutica</i> (Forssk.) T.Q.Nguyen, 1966	absolu
630926	<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle, 1920	absolu
628987	<i>Abildgaardia ovata</i> (Burm.f.) Kral, 1971	relatif
705750	<i>Acacia auriculiformis</i> A.Cunn. ex Benth., 1842	relatif
629013	<i>Acmella uliginosa</i> (Sw.) Cass., 1822	relatif
629028	<i>Aeschynomene americana</i> L., 1753	relatif
844204	<i>Aeschynomene evenia</i> C.Wright, 1869	relatif
629029	<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw., 1788	relatif
447711	<i>Alocasia cucullata</i> (Lour.) G.Don, 1839	relatif

CD NOM (TaxRef V17.0)	Nom de l'espèce (NOM_COMPLET TaxRef V17.0)	Présence d'une zone humide
447713	<i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don, 1839	relatif
637582	<i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) P.Beauv., 1818	relatif
81829	<i>Alternanthera paronychioides</i> A.St.-Hil.	relatif
81832	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC., 1813	relatif
629073	<i>Andropogon glomeratus</i> (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888	relatif
629079	<i>Annona montana</i> Macfad., 1837	relatif
447608	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst., 1891	relatif
629150	<i>Bauhinia multinervia</i> (Kunth) DC., 1825	relatif
631864	<i>Bignonia aequinoctialis</i> L., 1753	relatif
629295	<i>Centella erecta</i> (L.f.) Fernald, 1940	relatif
447722	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott, 1832	relatif
446169	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f., 1768	relatif
629401	<i>Conocarpus erectus</i> L., 1753	relatif
629420	<i>Cordia obliqua</i> Willd., 1794	relatif
447791	<i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw., 1788	relatif
447289	<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr., 1930	relatif
93613	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932	relatif
892031	<i>Cyperus aromaticus</i> var. <i>aromaticus</i> (Ridl.) Mattf. & Kük., 1936	relatif
629513	<i>Cyperus articulatus</i> L., 1753	relatif
456839	<i>Cyperus compressus</i> L., 1753	relatif
763481	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Endl. ex Hassk., 1844	relatif
637691	<i>Cyperus confertus</i> Sw., 1788	relatif
629514	<i>Cyperus distans</i> L.f., 1782	relatif
446184	<i>Cyperus elegans</i> L., 1762	relatif
671076	<i>Cyperus haspan</i> L., 1753	relatif
891802	<i>Cyperus hortensis</i> (Salzm. ex Steud.) Dorr, 2014	relatif
93954	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb., 1772	relatif
632972	<i>Cyperus ligularis</i> L., 1759	relatif
629516	<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz., 1786	relatif
629517	<i>Cyperus ochraceus</i> Vahl, 1806	relatif
446179	<i>Cyperus odoratus</i> L., 1753	relatif
446180	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb., 1772	relatif
632993	<i>Cyperus pumilus</i> L., 1756	relatif
446190	<i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb., 1773	relatif
629520	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb., 1773	relatif
629523	<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub., 1894	relatif
447726	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott, 1829	relatif

CD NOM (TaxRef V17.0)	Nom de l'espèce (NOM_COMPLET TaxRef V17.0)	Présence d'une zone humide
447070	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Schult., 1819	relatif
95669	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link, 1833	relatif
95806	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L., 1771	relatif
629604	<i>Eleocharis flavescens</i> (Poir.) Urb., 1903	relatif
446192	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	relatif
629606	<i>Eleocharis maculosa</i> (Vahl) Roem. & Schult., 1817	relatif
629611	<i>Eleocharis retroflexa</i> (Poir.) Urb., 1900	relatif
629738	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link, 1827	relatif
456840	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl, 1805	relatif
629766	<i>Genipa americana</i> L., 1759	relatif
633974	<i>Gomphrena vermicularis</i> L., 1753	relatif
629806	<i>Gynerium sagittatum</i> (Aubl.) P.Beauv., 1812	relatif
447933	<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig, 1783	relatif
101141	<i>Heliotropium curassavicum</i> L., 1753	relatif
445521	<i>Heliotropium indicum</i> L., 1753	relatif
629847	<i>Hibiscus bifurcatus</i> Cav., 1787	relatif
629861	<i>Hippomane mancinella</i> L., 1753	relatif
629870	<i>Hura crepitans</i> L., 1753	relatif
629872	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb., 1798	relatif
629886	<i>Hyptis atrorubens</i> Poit., 1806	relatif
447264	<i>Hyptis capitata</i> Jacq., 1781	relatif
445572	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk., 1775	relatif
445583	<i>Ipomoea setifera</i> Poir., 1804	relatif
630040	<i>Lindernia microcalyx</i> Pennell & Stehlé, 1938	relatif
729272	<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir.) Kunth ex DC., 1825	relatif
630064	<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara, 1953	relatif
447424	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven, 1962	relatif
630072	<i>Machaerium lunatum</i> (L.) Ducke, 1925	relatif
447318	<i>Malachra alceifolia</i> Jacq., 1789	relatif
447306	<i>Malachra capitata</i> (L.) L., 1767	relatif
630077	<i>Malachra fasciata</i> Jacq., 1789	relatif
630139	<i>Melothria pendula</i> L., 1753	relatif
630170	<i>Mimosa casta</i> L., 1753	relatif
532910	<i>Mimosa pigra</i> L., 1755	relatif
735351	<i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan, 1952	relatif
848306	<i>Nama jamaicensis</i> L., 1759	relatif
448010	<i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott, 1834	relatif

CD NOM (TaxRef V17.0)	Nom de l'espèce (NOM_COMPLET TaxRef V17.0)	Présence d'une zone humide
630220	<i>Nepsera aquatica</i> (Aubl.) Naudin, 1850	relatif
630222	<i>Neptunia pubescens</i> Benth., 1841	relatif
112483	<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	relatif
630314	<i>Paspalum fasciculatum</i> Willd. ex Flügge, 1810	relatif
112515	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw., 1788	relatif
630336	<i>Paullinia pinnata</i> L., 1753	relatif
630368	<i>Petiveria alliacea</i> L., 1753	relatif
113294	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene, 1899	relatif
113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	relatif
630454	<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass., 1826	relatif
630542	<i>Rhabdadenia biflora</i> (Jacq.) Müll.Arg., 1860	relatif
630548	<i>Rhynchospora contracta</i> (Nees) J.Raynal, 1978	relatif
630626	<i>Scleria microcarpa</i> Nees ex Kunth, 1837	relatif
447049	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb., 1832	relatif
630651	<i>Sesbania emerus</i> (Aubl.) Urb., 1919	relatif
630652	<i>Sesbania sericea</i> (Willd.) Link, 1822	relatif
630653	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr., 1912	relatif
446885	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L., 1759	relatif
124369	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench, 1794	relatif
630715	<i>Spermacoce eryngioides</i> (Cham. & Schltdl.) Kuntze, 1829	relatif
630717	<i>Spermacoce prostrata</i> Aubl., 1775	relatif
448438	<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski, 1996	relatif
630725	<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth, 1829	relatif
732397	<i>Steinchisma laxum</i> (Sw.) Zuloaga, 2003	relatif
630749	<i>Strachium sparganophorum</i> (L.) Kuntze, 1891	relatif
896042	<i>Talipariti pernambucense</i> (Arruda) Bovini, 2010	relatif
710962	<i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell, 2001	relatif
453661	<i>Torenia crustacea</i> (L.) Cham. & Schltdl., 1827	relatif