


Lundi 29 Juillet 2024

Carte de risque d'échouement pour les 4 prochains jours




■ Faible ■ Moyen ■ Fort ■ Très Fort

Indice de confiance : 5 / 5

Tableau de risque pour les 4j à venir :

Nord Atlantique	Moyen
Sud Atlantique	Fort
littoral Sud	Fort



Prévisions pour les 4 prochains jours:


Analyse sur la zone Antilles-Guyane :

Bulletin sargasses du 29 juillet 2024. Les images des 27 et 28 ont été analysées.
Juste à l'est des Antilles ainsi qu'entre les îles, de nombreux et longs filaments sont détectés, emportés par un courant qui les rapproche de nos côtes.
Peu de détections au large de la Guyane mais des images satellites sont absentes.

Analyse à proximité de la Martinique :

Échouements en hausse ! Prévision pessimistes pour la semaine.

Le long et large bancs de sargasses s'étendant de la Martinique, Pointe Saline à la Barbade est toujours d'actualité ! Peu de modification des dérives, mais suffisante pour que le Sud Caraïbe soit plus menacé qu'auparavant. Le Sud Atlantique aussi va continuer à recevoir des algues, et légèrement dans une moindre mesure le Nord Atlantique. Les quantités devraient être importantes, notamment dans le Sud : Diamant et éventuellement Ste-Luce, mais aussi côté Atlantique des Salines au Cap Macré.



Tendance pour les 2 prochaines semaines :

Échouements fort probables pour les 15 prochains jours.

Les sargasses détectées sur l'Atlantique proche et plus à l'est (à environ 150 km des côtes martiniquaises et guadeloupéennes) sont une menace pour les 15 jours à venir.


Indicateurs d'activité sur la Martinique

Indicateurs d'activité Sargasses au 26-07-2024




© Météo-France

Activité sargassique




Évolution de l'activité




x/5 : Indice de confiance sur l'évolution de l'activité

Composite 3 jours OLCI sur la Martinique

Composite 3 jours OLCI Sentinel-3 du 28-07-2024 & Champs de courant Globcurrent



Bancs de sargasses détectés les trois derniers jours





Tendance pour les 2 prochains mois:

Arrivages fort probables.

L'Atlantique est chargé en radeaux de sargasses à l'est de tous nos départements. Il convient donc de prévoir des échouements encore à cette échéance.

Image composite sur 7 jours du 29/07/2024 :



Notice du bulletin :

Météo-France opère depuis 2020, le bulletin d'information sur les afflux d'échouements de Sargasses sur les Antilles françaises et la Guyane. Dans le cadre de la mission Sargasses (Plan National I & II), le dispositif de surveillance et de prévision des échouements de Sargasses est depuis 2022, une mission institutionnelle.

La détection et la localisation des radeaux de sargasses autour de l'arc antillais sont réalisées par télédétection à moyenne et haute résolution après acquisition et post-traitement spécifique des données issues des capteurs optiques embarqués suivants:

- MODIS (Satellite Aqua et Terra), à 1km de résolution
- OLCI (Satellite Sentinel 3A/3B) à 300m de résolution
- VIIRS (Satellite Noaa 20 et Suomi -NPP) à 1km de résolution
- MSI (Satellites Sentinel-2A/2B) à 10-30 m de résolution

Les deux derniers sont utilisés à titre d'appui pour l'expertise.

Les trajectoires de dérive des radeaux de sargasses détectés sont calculées à partir du modèle de dérive de Météo-France d'objets flottants MOTHY (Modèle Océanique de Transport d'Hydrocarbures).

Ce modèle simule le déplacement des nappes identifiées en prenant en compte l'effet combiné du vent de surface et des courants marins. Il est forcé par le modèle IFS du Centre Européen de Prévision pour le champ de vent à 0,025° et sur Mercator au 1/12° pour la courantologie.

Le risque d'échouement est estimé, sur une échelle de faible à très fort, à partir de la prévision de dérive. Il augmente en fonction du nombre et de la taille des nappes détectées et du taux de convergence des trajectoires de dérive calculées vers le secteur côtier concerné.

Carte Composite 3j et Champs de circulation

Les champs de courant représentent la circulation satellite journalière observée dans le bassin par l'effet couplé du courant et du vent. À ce champ se superposent les principaux bancs de sargasses détectés par le satellite moyenne résolution (OLCI-Sentinel 3) moyenné sur les 3 jours précédents.

Indicateur d'activité Sargasses

Des indicateurs de jauges à niveaux déclinent l'activité sargasses à J-3 sur des zones de surveillance à enjeux pour le territoire. La jauge d'activité augmente en fonction de la surface de sargasses estimées dans la zone d'expertise dans laquelle elle est contenue à J-3 et est objectivé sur une échelle allant de faible à record, par rapports aux surfaces estimées sur la période 2011-2021. Un pictogramme en flèche en dessous de la jauge indique de plus, l'évolution de cette activité sur la période allant de J-3 à J-9 par le calcul d'une tendance sur les surfaces estimées.

Limites du dispositif de prévision:

En masquant partiellement la zone surveillée, la couverture nuageuse constitue la principale limite du dispositif de veille satellitaire. La qualité de l'information spatiale des bancs de sargasses alimentant le modèle de dérive et les indicateurs en dépend donc fortement. Un indice de confiance est ainsi établi pour le risque sur la base du taux de couverture nuageuse autour du territoire concerné.

Un indice de confiance est également établi sur l'évolution de l'activité sur la base des surfaces estimées sur 7 jours par rapport à la moyenne.

Pour la tendance à deux semaines, une expertise complémentaire par zone peut parfois apparaître en dessous de la carte des indicateurs.

La chaîne de prévision actuelle ne permet pas d'estimer avec finesse la quantité d'algues susceptible de s'échouer. En effet, les résolutions et les traitements appliqués aux données satellitaires ne permettent pas d'apprécier précisément les volumes d'algues en jeu.

Les prévisions sont ainsi déclinées par grands secteurs côtiers, fréquemment exposés aux échouements.

